

乳幼児 定期予防接種

予防接種を受ける前に、新生児訪問でお渡しした、「予防接種と子どもの健康」をお読みの上、お子さんの健康状態に十分配慮していただき、体調の良い時に接種をお願い致します。

予防接種の種類	標準接種時期（法定接種期間）	間隔	接種回数・方法
ロタウイルス (ロタリックス)	生後6週～24週まで (初回接種は生後2か月～14週6日までの間)	27日以上	2回 経口接種
ロタウイルス (ロタテック)	生後6週～32週まで (初回接種は生後2か月～14週6日までの間)	27日以上	3回 経口接種
B型肝炎	生後2～9か月 (生後1歳に至るまで)	2回目は1回目の注射から27日以上	初回2回 皮下接種
		1回目の注射から139日以上	追加1回 皮下接種
小児肺炎球菌ワクチン (初回)	生後2～7か月	27日以上	3回 筋肉内または皮下接種
小児肺炎球菌ワクチン (追加)	生後12～15か月	初回3回目から60日以上	1回 筋肉内または皮下接種
五種混合1期 (初回)	生後2～7か月	20日以上	3回 筋肉内または皮下接種
五種混合1期 (追加)	初回終了後6か月～1年半	初回3回目から6か月以上	1回 筋肉内または皮下接種
ヒブワクチン (初回)	生後2～7か月	27日～56日	3回 皮下接種
ヒブワクチン (追加)	初回終了後7か月～1年1か月	初回3回目から7か月以上	1回 皮下接種
BCG	生後5～8か月（1歳まで）		1回 経皮接種
麻しん・風しん 混合ワクチン	生後12～24か月（2歳まで）		1回 皮下接種
水痘ワクチン (初回)	生後12～15か月		1回 皮下接種
水痘ワクチン (追加)	初回終了後6か月～1年	3か月以上（標準的には6～12か月）	1回 皮下接種

※対象者には個別でお知らせします。